

























ヒト成長ホルモン剤・特徴一覧

企業名 (コールセンター)	薬剤名	規格	使用 期限	薬剤の性状 (溶解操作の有無)	専用注入器	注入器の電池 電源に関する情報	専用注射針
ノボ ノルディスク ファーマ 株式会社 0120-180-363 (月～金) 祝日・会社休日を除く 0120-359-516 (夜間及び 土日・祝日・会社休日)	ノルデイトロピン® S注 	10mg	使用後 35日	液状品 (溶解操作不要)	ノルディペン® 10 	-	JIS A型
	ノルデイトロピン® フレックスプロ® 注 	5mg 10mg 15mg	使用後 35日	液状品 (溶解操作不要)	- (薬剤一体型のため 専用注入器不要)	-	JIS A型
ファイザー株式会社 0120-303-415 24時間365日	ジェントロピン® TC 	5.3mg 12mg	溶解後 4週間	凍結乾燥品 (溶解操作必要)	ジェントロピンペン® G 	電池を内蔵するため、 製造日から3年 (使用開始から2年) を耐用年数とする。	JIS A型
	ジェントロピン® ゴークイック 	5.3mg 12mg	溶解後 4週間	凍結乾燥品 (溶解操作必要)	- (薬剤一体型のため 専用注入器不要)	-	JIS A型
JCRファーマ株式会社 0120-999-393 (月～金 9時～19時) 祝日・会社休日を除く 留守番電話対応 (月～金 19時～9時 土日・祝日・会社休日)	グロウジェクト® 皮下注 	6mg 12mg	使用後 35日	液状品 (溶解操作不要)	グロウジェクター® L  ツインジェクター® EZ II 	専用充電台にて充電。 初回の用量設定から 3年を耐用年数とする。	JIS A型 針なしシリンジ
	グロウジェクト® BC注射用 	8mg	溶解後 42日	凍結乾燥品 (溶解操作必要)	BDペンジェクター™ 3  グロウジェクター® 2 	- 専用充電台にて充電。 初回の用量設定から 3年を耐用年数とする。	JIS A型 JIS A型
	グロウジェクト® 注射用 	1.33mg 8mg	溶解後 14日 溶解後 42日	凍結乾燥品 (溶解操作必要)	ツインジェクター® EZ II 	-	針なしシリンジ
	ヒューマトローフ® 	6mg 12mg	溶解後 38日	凍結乾燥品 (溶解操作必要)	ヒューマトローペン® 	-	JIS A型
富士フィルムファーマ 株式会社 0120-198-714 (7時～23時) 365日	サイゼン® 皮下注 	8mg	溶解後 21日	凍結乾燥品 (溶解操作必要)	ワンクリック™  イージーポット™ 	- 電池(単4形乾電池を 4本)を使用	BDマイクロファインプラス™ 31G8mm セロファイン30G8mm
	サイゼン® 皮下注射液 	12mg	使用後 28日	液状品 (溶解操作不要)	-	-	-
サンド株式会社 0120-062-256 (月～金 8時30分 ～22時30分) 祝日・会社休日を除く	ソマトロピンBS皮下注「サンド」 	5mg 10mg	使用後 28日	液状品 (溶解操作不要)	オムニトローフ® ペン 	-	JIS A型
	ソマトロピンBS皮下注「サンド」シュアパル 	5mg 10mg	使用後 28日	液状品 (溶解操作不要)	シュアパル® 	-	JIS A型

JIS A型専用注射針	ペンニードル®*
	BDマイクロファインプラス™
	ナノパス®

※ペンニードル® プラス32G 4mm は以下の注射用補助具(針隠し)との組み合わせでは使用できません。
(2016年12月現在)

- ・ジェントロピンペン® G 『ペンカバー』 (ファイザー株式会社)
- ・ヒューマトローペン® 『針隠しカバー』 (日本イーライリリー株式会社)
- ・シュアパル® 『針隠し』 (サンド株式会社)

*注射用補助具(針隠し)を使用されない場合はお使い頂きます。

- 使用に際しては医師の指示に従ってください
- 専用注入器および専用注射針をお使いください